商品利用についての同意書

この度は数ある薬局の中、当店をご利用いただきましてありがとうございます。

ドレミ薬局塩化アルミニウム・塩化ベンザルコニウム液とサリチル・ミョウバン散(汗止めパウダー) に関しての使い方と注意点について、まとめております。

以下の内容に関してご理解・同意していただきましたら、注文フォームの同意欄にチェックをお願いいたします。

ドレミ薬局塩化アルミニウム・塩化ベンザルコニウム液(汗止め液)について

- ●ドレミ薬局塩化アルミニウム・塩化ベンザルコニウム液(汗止め液)は、収れん作用のある塩化アルミニウム 20%と、殺菌消毒作用のある塩化ベンザルコニウム 0.02%の水溶液で、皮膚の殺菌・消毒に用いる外皮用薬です。
- ●次の場合は直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (1) 使用後、皮膚に発疹・発赤、痒みが現れた場合
- (2) 5~6日間使用しても症状が良くならない場合

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指揮監督のもとに使用させてください
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、直ぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお症状が重い場合には、眼科医の診断を受けてください
- (4) 外用にのみ使用してください
- ●保管及び取扱い上の注意
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください (冷蔵庫での保管は避けてください)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)

●汗止め液の使い方

その1: 使用前によく振ってください。寝る前に手をよく洗い、500円玉大のサイズを手のひらに取ります。よく塗りこんだ後、扇風機などの冷風を使い乾かします。これを3回繰り返してください。ツッパリ感が出たら効果でている合図です。ツッパリ感が出るまで2~3日間使用を続けます。塗る範囲はハガキ4枚程度にとどめてください。

その2:効果が出ている時は汗止め液の使用を中止してください ※効果は10~14日程持続します

休止期間を作ることで長く効果を持続することにつながります。

その3: 脇は刺激に弱い箇所です。通常の脱毛の場合は24時間以上休止してください。 (エステの脱毛時は一週間休止)

- ●汗止め液の使い方の注意点
 - (1) 衣服が変色したり、生地を傷めることがあります。
 - (2) 体調の変化により効果が減弱することがあります。
 - ・生理前 ・ストレス ・睡眠不足 ・風邪などの病気にかかった時など。
 - (3) かゆみや刺激がでることがあります。

精製水で薄めるか、冷蔵庫で冷やして使用してみてください。

(冷蔵庫での保存は効果が弱くなるため、通常は常温で保存してください)

サリチル・ミョウバン散(汗止めパウダー)について

- ●ドレミ薬局サリチル・ミョウバン散 (汗止めパウダー) は、殺菌、制汗、収れん、消臭作用のあるミョウバンを用いる外皮用薬です。
- ●用法・用量

1日2回(朝と夜)に適量取り、ワキや首回りなど、汗やにおいを抑えたいところにすりこむ。
※衣服が汚れる事がありますので取り扱いにはご注意ください

当社別売りの塩化アルミニウム液 20% (汗止め液) と併せて頂く際は1時間以上の間隔をあけて下さい

ドレミ薬局

〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂 1-8-8 1F

TEL: 092-405-0333

Email: doremi-shop@mbr.nifty.com

- ●定休日:日曜・祝祭日・夏季・年末年始
- ●営業時間: 9:00-18:30 (月、火、木、金)

9:00-18:00 (水、土)